

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
大腸癌	■進行・再発 □術前補充療法 □術後補助療法	Bev+FTD/TPI療法 4週毎	28日間	規定無し	中

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ヘバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	90分（初回） 60分（2回目） 30分（3回目以降）	↓														↓													
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓														↓													
※	FTD/TPI	下記参照	内服	1日2回朝夕食後	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓	↓														

《注意事項・備考》

- ・ Bev：初回90分で投与し2回目以降60分→30分と投与時間短縮可能
- ・ FTD/TPI用量：1.07＞BSA：70mg/day、1.07≦BSA＜1.23：80mg/day、1.23≦BSA＜1.38：90mg/day、1.38≦BSA＜1.53：100mg/day、1.53≦BSA＜1.69：110mg/day、1.69≦BSA＜1.84：120mg/day、1.84≦BSA＜1.99：130mg/day、1.99≦BSA＜2.15：140mg/day、2.15≦BSA：150mg/day
- ・ FTD/TPI服用期間：day1 夕食後～day6 朝食後まで・day8夕食後～day13朝食後まで（2週毎レジメンと内服期間異なるため注意）