

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024年12月1日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
大腸癌	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前補充療法 <input type="checkbox"/> 術後補助療法	Bev+S-1療法	21日間	規定無し	軽

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	ペバシズマブ 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	点滴静注	90分（初回） 60分（2回目） 30分（3回目以降）	↓																				
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																				
※	S-1	下記参照	内服	1日2回朝夕食後	↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓					

《注意事項・備考》

- ・ Bev：初回90分で投与し2回目以降60分→30分と投与時間短縮可能
- ・ S-1用量：BSA < 1.25㎡：80mg/day、1.25㎡ ≤ BSA < 1.5㎡：100mg/day、BSA ≥ 1.5㎡：120mg/day
- ・ S-1服用期間：day1 夕食後～day15 朝食後まで
- ・ 流涙（S-1）：ソフトサンティア適宜使用