

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
大腸癌 (BRAFV600E変異型)	☒ 進行・再発 ☐ 術前補充療法 ☐ 術後補助療法	Bev+mFOLFOXIRI療法	14日間	12コースまで	高

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	デキサート パロノセトロン アロカリス 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 235mg 100mL	点滴静注	30分	↓													
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
③	ベバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	90分（初回） 60分（2回目） 30分（3回目以降）	↓													
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
⑤	イリノテカン 生理食塩液	150mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓													
⑥※	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	120分	↓													
⑦※	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	120分	↓													
⑧	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
⑨	フルオロウラシル（5FU） 生理食塩液	2400mg/m ² 適量	点滴静注	46時間	↓	↓	↓											
※	⑥と⑦は同時に投与																	

《注意事項・備考》

- ・ Bev：初回90分で投与し2回目以降60分→30分と投与時間短縮可能
- ・ 制吐療法：day2-3にかけてデカドロン8mg朝食後服用（状況に応じてステロイドスペアリング考慮）
- ・ FN対策：day4にジーラスタ投与を考慮する場合あり
- ・ 最大12コースまでとし13コース以降はBev+5FU/LV療法もしくはBev+FOLFIRI療法へ切り替えとする