【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数
乳癌	■進行・再発 □術前補充療法 □術後補助療法	Bev+weekly PTX療法	28日間	規定無し

催吐リスク
軽

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトロン デキサート ポララミン ファモチジン 生理食塩液	0.75mg 6.6mg 5mg 20mg 100mL	点滴静注	20分	↓							↓							↓													
②	パクリタキセル 生理食塩液	90mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓							↓							↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓							↓							↓													
④	ベバシズマブ 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴静注	90分（初回） 60分（2回目） 30分（3回目以降）	↓														↓													
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓														↓													

《注意事項・備考》

・PTX：アレルギー対策としてポララミン注5mg+ファモチジン注20mg前投与

・PTX：アルコール含有のため、点滴当日は運転・機械の操作は行わないこと。（アルコール禁の患者では選択しないこと）

・Bev：初回90分で投与し2回目以降60分→30分と投与時間短縮可能