

# 【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

| 対象疾患 | 適応                                                                                                              | レジメン名 | コース期間 | 総コース数               | 催吐リスク |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------|
| 胃癌   | <input type="checkbox"/> 進行・再発<br><input type="checkbox"/> 術前補充療法<br><input checked="" type="checkbox"/> 術後補助療法 | DS療法  | 21日間  | S-1：1年間<br>DTX：6回まで | 軽     |

|   | 薬品名                       | 投与量                          | 投与経路 | 投与時間     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---------------------------|------------------------------|------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                           |                              |      |          | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ① | デキサート<br>パロノセトロン<br>生理食塩液 | 6.6mg<br>0.75mg<br>100mL     | 点滴静注 | 20分      | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ② | ドセタキセル<br>生理食塩液           | 40mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 点滴静注 | 60分      | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ③ | 生理食塩液                     | 50mL                         | 点滴静注 | 10分      | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ※ | S-1                       | 下記参照                         | 内服   | 1日2回朝夕食後 | ↓   | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  |
|   |                           |                              |      |          |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 《注意事項・備考》

- ・ 制吐療法：悪心嘔吐状況に応じてアロカリス点滴静注235mg投与を考慮、投与の際はデキサート3.3mgへ減量とする
  - ・ S-1用量：BSA<1.25㎡：80mg/day、1.25㎡≦BSA<1.5㎡：100mg/day、BSA≧1.5㎡：120mg/day
  - ・ S-1服用期間：day1 夕食後～day15 朝食後まで（1コース目～7コース目まで2投1休：8コース目からは原則4投2休 total 1年間服用）
  - ・ 流涙（S-1）：ソフトサンティア適宜使用
  - ・ DTX：2コース目～7コース目の計6回投与（投与中、浮腫予防でDEX4-8mg/day/2-3日間服用）