

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
食道癌	■進行・再発 ☐術前補充療法 ☐術後補助療法	FP療法	28日間	6コースまで	高

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	硫酸Mg補正液 生理食塩液	20mEq 1000mL	点滴静注	240分	↓																											
②	デキサート パロノセトロン アロカリス 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 235mg 100mL	点滴静注	30分	↓																											
③	デキサート 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注	30分		↓	↓	↓	↓																							
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																											
⑤	ランダ 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴静注	120分	↓																											
⑥※	フルオロウラシル 生理食塩液	800mg/m ² 1000mL	点滴静注	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																							
⑦※	マンニトールS	300mL	点滴静注	120分	↓																											
⑧※	生理食塩液	500mL	点滴静注	120分	↓																											
⑨	ヴィーンF	500mL	点滴静注	120分		↓	↓																									
⑩	ヴィーンF	500mL	点滴静注	120分		↓	↓																									
	※⑥と⑦、⑧は同時滴下																															

《注意事項・備考》

- ・免疫チェック阻害剤が使用できずかつ経口投薬できない時のみ選択

・制吐療法：悪心嘔吐状況に応じてday1～ORA5mg/day 5日間考慮

・CDDP：6コース目まで（当院ではショートハイドレーション法は未採用、原則入院対応）