

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
胃癌	■進行・再発 ☐術前補充療法 ☐術後補助療法	FP療法	21日間	6コース	高

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	硫酸Mg補正液 生理食塩液	20mEq 1000mL	点滴静注	240分	↓																				
②	デキサート パロノセトロン アロカリス 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 235mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
③	デキサート 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注	30分		↓	↓	↓	↓																
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																				
⑤	ランダ 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴静注	120分	↓																				
⑥※	フルオロウラシル 生理食塩液	800mg/m ² 1000mL	点滴静注	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																
⑦※	マンニトールS	300mL	点滴静注	120分	↓																				
⑧※	生理食塩液	500mL	点滴静注	120分	↓																				
⑨	ヴィーンF	500mL	点滴静注	120分		↓	↓																		
⑩	ヴィーンF	500mL	点滴静注	120分		↓	↓																		
	※⑥と⑦、⑧は同時滴下																								

《注意事項・備考》

- ・ SP療法適応患者で経口投薬できない時のみ選択
 - ・ 制吐療法：悪心嘔吐状況に応じてday1～ORA5mg/day 5日間考慮
 - ・ CDDP：6コース目まで（当院ではショートハイドレーション法は未採用、原則入院対応）