

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024年12月1日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
胆道癌	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前補充療法 <input type="checkbox"/> 術後補助療法	GCS療法	14日間	規定無し	中

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	マンニトールS	300mL	点滴静注	60分	↓													
②	硫酸Mg補正液 生理食塩液	20mEq 1000mL	点滴静注	180分	↓													
③	デキサート パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 100mL	点滴静注	30分	↓													
④	ランダ 生理食塩液	25mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓													
⑤	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓													
⑥	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
※	S-1	下記参照	内服	1日2回朝夕食後	↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓						

《注意事項・備考》

- ・ CDDPによる蓄積毒性予防のためCDDP投与は16コースまでで終了を考慮
- ・ 16コース終了後はCDDPを中止して継続もしくはGS療法への変更を検討
- ・ S-1用量：BSA < 1.25m²：80mg/day、1.25m² ≤ BSA < 1.5m²：100mg/day、BSA ≥ 1.5m²：120mg/day
- ・ S-1服用期間：day1 夕食後～day8 朝食後まで
- ・ 流涙（S-1）：ソフトサンティア適宜使用