

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
胆道癌	■進行・再発 ☐ 術前補充療法 ☐ 術後補助療法	GC療法	21日間	規定無し	中

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	マンニトールS	300mL	点滴静注	60分	↓							↓													
②	硫酸Mg補正液 生理食塩液	20mEq 1000mL	点滴静注	180分	↓							↓													
③	デキサート パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 100mL	点滴静注	30分	↓							↓													
④	ランダ 生理食塩液	25mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓							↓													
⑤	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓							↓													
⑥	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓							↓													

《注意事項・備考》

・ CDDPによる蓄積毒性予防のためCDDP投与は8コースまでで終了を考慮

・ 8コース終了後はCDDPを中止して継続もしくはGEM単独療法への変更を検討