

# 【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

| 対象疾患 | 適応                                                                                                             | レジメン名 | コース期間 | 総コース数 | 催吐リスク |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 胆道癌  | <div><div>■進行・再発</div><div><input type="checkbox"/>術前補助療法</div><div><input type="checkbox"/>術後補助療法</div></div> | GS療法  | 21日間  | 規定無し  | 中     |

|   | 薬品名                       | 投与量                            | 投与経路 | 投与時間     | day |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|---|---------------------------|--------------------------------|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
|   |                           |                                |      |          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ① | ソルデム3A                    | 200mL                          | 点滴静注 | 60分      | ↓   |     |     |     |     |     |     | ↓   |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
| ② | パロノセトロン<br>デキサート<br>生理食塩液 | 0.75mg<br>6.6mg<br>100mL       | 点滴静注 | 20分      | ↓   |     |     |     |     |     |     | ↓   |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
| ③ | ゲムシタビン<br>生理食塩液           | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | 点滴静注 | 30分      | ↓   |     |     |     |     |     |     | ↓   |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|   |                           |                                |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
| ※ | S-1                       | 下記参照                           | 内服   | 1日2回朝夕食後 | ↓   | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓ ↓ | ↓  |    |    |    |    |    |
|   |                           |                                |      |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |

## 《注意事項・備考》

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ・制吐療法：悪心嘔吐状況に応じてアロカリス点滴静注235mg投与を考慮、投与の際はデキサート3.3mgへ減量とする                         |
| ・GEM：血管痛対策として溶解液を必要に応じて5％ブドウ糖液へ変更を考慮                                              |
| ・S-1用量：BSA<1.25㎡：80mg/day、1.25㎡≦BSA<1.5㎡：100mg/day、BSA≧1.5㎡：120mg/day（膵癌に準じた用量設定） |
| ・S-1服用期間：day1 夕食後～day15 朝食後まで                                                     |
| ・流涙（S-1）：ソフトサンティア適宜使用                                                             |