【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数
乳癌	□進行・再発 □術前補充療法 ■術後補助療法	Her+weekly PTX療法	21日間	18コース

催吐リスク
軽

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																				
②	ハーセプチン 生理食塩液 大塚蒸留水	初回：8mg/kg 2回目～：6mg/kg 250mL 溶解用	点滴静注	初回：90分 2回目～：30分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																				
①	パロノセトロン デキサート ポララミン ファモチジン 生理食塩液	0.75mg 6.6mg 5mg 20mg 100mL	点滴静注	20分	↓							↓							↓						
②	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓							↓							↓						
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓							↓							↓						

《注意事項・備考》

・術後補助療法：18コースまで（PTX投与は4コースで終了、以降Her単独療法14コース継続）
・PTX：アレルギー対策としてポララミン注5mg+ファモチジン注20mg前投与
・PTX：アルコール含有のため、点滴当日は運転・機械の操作は行わないこと。（アルコール禁の患者では選択しないこと）
・Her：4コース毎に心エコー評価