

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
胃癌	■進行・再発 ☐術前補充療法 ☐術後補助療法	NIBO+mFOLFOX6療法	14日間	規定無し	中

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	オブジーボ 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴静注	30分	↓													
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
③	デキサート パロノセトロン 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 100mL	点滴静注	20分	↓													
④※	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	120分	↓													
⑤※	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	120分	↓													
⑥	フルオロウラシル（5FU） 生理食塩液	400mg/m ² 50mL	点滴静注	15分	↓													
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
⑧	フルオロウラシル（5FU） 生理食塩液	2400mg/m ² 適量	点滴静注	46時間	↓	↓	↓											
※	④と⑤は同時に投与																	

《注意事項・備考》

- ・ 高度腹水等、内服困難症例で選択を考慮
- ・ 制吐療法：悪心嘔吐状況に応じてアロカリス点滴静注235mg投与を考慮、投与の際はデキサート3.3mgへ減量とする