

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
食道癌	☒ 進行・再発 ☐ 術前補充療法 ☐ 術後補助療法	Pemb+FP療法	21日間	6コースまで	高

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																											
②	キイトルーダ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	30分	↓																											
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																											
④	硫酸Mg補正液 生理食塩液	20mEq 1000mL	点滴静注	240分	↓																											
⑤	デキサート パロノセトロン アロカリス 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 235mg 100mL	点滴静注	30分	↓																											
⑥	デキサート 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注	30分		↓	↓	↓	↓																							
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																											
⑧	ランダ 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴静注	120分	↓																											
⑨※	フルオロウラシル 生理食塩液	800mg/m ² 1000mL	点滴静注	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																							
⑩※	マシコトール®S	300mL	点滴静注	120分	↓																											
⑪※	生理食塩液	500mL	点滴静注	120分	↓																											
⑫	ヴィーンF	500mL	点滴静注	120分		↓	↓																									
⑬	ヴィーンF	500mL	点滴静注	120分		↓	↓																									
	※⑨と⑩、⑪は同時滴下																															

《注意事項・備考》

- ・ 制吐療法：悪心嘔吐状況に応じてday1～ORA5mg/day 5日間考慮
- ・ CDDP：6コース目まで（当院ではショートハイドレーション法は未採用、原則入院対応）
→7コース目以降：Pemb+5FU併用療法へ移行