

# 【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024年12月1日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
乳癌	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前補充療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助療法	Per+Her+DTX療法	21日間	進行・再発：規定無し 術後補助療法：18コース	軽

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	パージェタ 生理食塩液	初回：840mg/body 2回目～：420mg/body 250mL	点滴静注	初回：60分 2回目～：30分	↓																				
②	ハーセプチン 生理食塩液 大塚蒸留水	初回：8mg/kg 2回目～：6mg/kg 250mL 溶解用	点滴静注	初回：90分 2回目～：30分	↓																				
③	パロノセトロン デキサート 生理食塩液	0.75mg 6.6mg 100mL	点滴静注	20分	↓																				
④	ドセタキセル 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓																				

## 《注意事項・備考》

- ・ 術後補助療法：DTX併用は4コース目まで  
5コース目以降はPer+Her：2剤併用療法へ移行（通常total 1年間継続：全18コースで完結）
- ・ 進行再発：DTX併用は6コース目で継続の可否を評価（心不全リスク：浮腫の発生頻度上昇のため）  
DTX終了後はPer+Her：2剤併用療法へ移行（PDまで）
- ・ 浮腫予防：DTX併用中はDEX4-8mg/day/2-3日間服用
- ・ Per・Her：4コース毎に心エコー検査実施