【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数
胃癌	■進行・再発 □術前補充療法 □術後補助療法	RAM+FTD/TPI療法	28日間	規定無し

催吐リスク
中

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポララミン注 生理食塩液	5mg 100mL	点滴静注	20分	↓														↓													
②	サイラムザ 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴静注	60分	↓														↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓														↓													
※	FTD/TPI	下記参照	内服	1日２回朝夕食後	↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓		↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓															

《注意事項・備考》

・RAM：インフュージョンリアクション対策としてポララミン注5mg前投与

・FTD/TPI用量：1.07＞BSA：70mg/day、1.07≦BSA＜1.23：80mg/day、1.23≦BSA＜1.38：90mg/day、1.38≦BSA＜1.53：100mg/day、1.53≦BSA＜1.69：110mg/day、1.69≦BSA＜1.84：120mg/day、1.84≦BSA＜1.99：130mg/day、1.99≦BSA＜2.15：140mg/day、2.15≧BSA：150mg/day

・FTD/TPI服用期間：day1 夕食後～day6 朝食後まで・day8夕食後～day13朝食後まで