

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
胃癌	☒ 進行・再発 ☐ 術前補充療法 ☐ 術後補助療法	RAM+weekly PTX療法	28日間	規定無し	軽

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトロン デキサート ポララミン ファモチジン 生理食塩液	0.75mg 6.6mg 5mg 20mg 100mL	点滴静注	20分	↓							↓							↓													
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													↓														
③	サイラムザ 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴静注	60分	↓													↓														
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													↓														
④	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓							↓						↓														
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓							↓						↓														

《注意事項・備考》

・ PTX/RAM：アレルギー・インフュージョンリアクション対策としてポララミン注5mg+ファモチジン注20mg前投与
・ PTX：アルコール含有のため、点滴当日は運転・機械の操作は行わないこと。（アルコール禁の患者はnabPTXを選択）