

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
胃癌	■進行・再発 ☐ 術前補充療法 ☐ 術後補助療法	SP療法	35日間	6コース	高

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	・	・	・	35					
	YDソリタT3	500mL	点滴静注	120分							↓		↓																					
	YDソリタT3	500mL	点滴静注	120分							↓		↓																					
	YDソリタT3	500mL	点滴静注	120分							↓		↓																					
	YDソリタT3	500mL	点滴静注	120分							↓		↓																					
①	硫酸Mg補正液 生理食塩液	20mEq 1000mL	点滴静注	240分								↓																						
②	デキサート パロノセトロン アロカリス 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 235mg 100mL	点滴静注	30分								↓																						
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分								↓																						
④	ランダ 生理食塩液	60mg/㎡ 500mL	点滴静注	120分								↓																						
⑤	YDソリタT3	500mL	点滴静注	120分								↓																						
⑥	マンニトールS	300mL	点滴静注	120分								↓																						
⑦	YDソリタT3	500mL	点滴静注	120分								↓																						
⑧	YDソリタT3	500mL	点滴静注	120分								↓																						
※	S-1	下記参照	内服	1日2回朝夕食後	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓		

《注意事項・備考》

- ・制吐療法：day2～DEX8mg/day 2日間（悪心嘔吐状況に応じてday1～ORA5mg/day 5日間考慮）
- ・S-1用量：BSA<1.25㎡：80mg/day、1.25㎡≦BSA<1.5㎡：100mg/day、BSA≧1.5㎡：120mg/day
- ・S-1服用期間：day1 朝食後～day21 夕食後まで（6コース完遂後は原則S-1単独療法へ移行：4投2休）
- ・流涙（S-1）：ソフトサンティア適宜使用
- ・CDDP：6コース目まで（当院ではショートハイドレーション法は未採用、原則入院対応）