

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
乳癌	☐ 進行・再発 ☐ 術前補充療法 ☒ 術後補助療法	ddEC療法	14日間	4コース	高

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	パロノセトロン デキサート アロカリス 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 235mg 100mL	点滴静注	30分	↓													
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
③	エピルビシン 生理食塩液	90mg/m ² 100mL	点滴静注	10分	↓													
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													
⑤	エンドキサン 生理食塩液	600mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓													
⑥	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓													

《注意事項・備考》
・ 選択基準（年齢）：60歳未満で選択可
・ 発熱性好中球減少予防：ジーラスタ併用（2日目）
・ 術後補助療法として4コースで終了。終了後、DTX単独療法へ移行。
・ 制吐療法：DEX4-8mg/day/2-3日間服用
・ エピルビシン：化学療法開始前、4コース終了時に心エコー検査を実施する。