

【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
食道癌	■進行・再発 ☐術前補助療法 ☐術後補助療法	weekly PTX療法 (1コース：7週)	49日間	規定無し	軽

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																		
					1	2	・ ・	8	9	・ ・	15	16	・ ・	22	23	・ ・	29	30	・ ・	36	37	・ ・	49
①	パロノセトロン デキサート ポララミン ファモチジン 生理食塩液	0.75mg 6.6mg 5mg 20mg 100mL	点滴静注	20分	↓			↓			↓			↓			↓			↓			
②	パクリタキセル 生理食塩液	100mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓			↓			↓			↓			↓			↓			
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓			↓			↓			↓			↓			↓			

《注意事項・備考》

・ PTX：アレルギー対策としてポララミン注5mg+ファモチジン注20mg前投与
・ PTX：アルコール含有のため、点滴当日は運転・機械の操作は行わないこと。（アルコール禁の患者では選択しないこと）