

【その他 化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024 年 12 月 1 日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
潰瘍性大腸炎		エンタイビオ初回導入	初回 2週後 6週後		

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day												
					1	2	3	・ ・	15	16	17	・ ・	43	44	45	・ ・	98
①	生理食塩液	100mL	点滴静注	20分	↓				↓				↓				
②	エンタイビオ 大塚蒸留水 生理食塩液	300mg/body 溶解用 100mL	点滴静注	30分	↓				↓				↓				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	10分	↓				↓				↓				

《注意事項・備考》

開始前準備【必須検査】
①結核感染の既往の有無確認 ツベルクリン反応検査/インターフェロン-γ遊離試験（クオンティフェロン） 胸部CT検査/胸部X線 →既往が疑われた場合抗結核薬の前投与開始 【エンタイビオ開始3週間前～6ヶ月間：イソニアジド300mg/day】
②B型肝炎スクリーニング【化学療法と同じ扱い】
③原則生ワクチン接種を行わないこと【治療前・中】